

# افزایش بیان ژن‌های مسیر فنیل پروپانوئیدی و تولید پودوفیلو توکسین با اثر کیتوزان در کشت سلول کتان سفید

صدیقه اسماعیل زاده‌بهبادی<sup>۱\*</sup>، مظفر شریفی<sup>۲</sup>، مهرداد بهمنش<sup>۳</sup>

۱- استادیار، گروه زیست‌شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه زابل، زابل، ایران.

۲- دانشیار، گروه علوم گیاهی، دانشکده علوم زیستی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

۳- استادیار، گروه ژنتیک، دانشکده علوم زیستی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

\* کد پستی ۹۸۶۱۵-۵۳۸، زابل، ایران.

shirin\_esm@yahoo.com, esmaeilzadeh@uoz.ac.ir

(دریافت مقاله: ۹۱/۵/۱۷، پذیرش: ۹۲/۲/۱۶)

**چکیده**- کتان سفید (*Linum album*) گیاهی علفی و دارویی است که لیگنان‌های مهمی مانند پودوفیلو توکسین تولید می‌کند. پودوفیلو توکسین و مشتقات آن، ویژگی‌های خواص ضدویروسی و ضدسرطان دارند. با توجه به این که ساخت شیمیایی پودوفیلو توکسین اقتصادی نیست، تولید آن با کشت سلول گونه‌های سرده *Linum*، جایگزین سودمندی است. روش‌های زیادی برای افزایش تولید متabolیت‌های ثانوی در کشت سلول استفاده می‌شود. در این پژوهش، اثر کیتوزان بر رشد سلول و میزان پودوفیلو توکسین، ۱، ۲، ۳ و ۵ روز پس از افزودن به محیط در کشت سلول گونه *L album* بررسی شد. بیشترین میزان پودوفیلو توکسین، روز پنجم پس از تیمار، با اندازه‌ی دو برابر دیده شد. برای درک سازو کار کیتوزان، بیان ژن فنیل آلانین آمونیالیاز (PAL)، سینامیل آکلر دهیدروژنаз (CAD)، سینامویل کوا ردوکتاز (CCR) و پینورزینول لاریسی رزینول ردوکتاز (PLR) بررسی شد. بیان ژن‌ها بعد از افزودن کیتوزان، افزایش یافت و اوج بیان آن‌ها پس از ۳ روز دیده شد. کیتوزان با اثر بر بیان ژن آنزیم‌های مسیر بیوسنتزی پودوفیلو توکسین، باعث افزایش میزان پودوفیلو توکسین شد.

**واژگان کلیدی:** بیان ژن، پودوفیلو توکسین، کیتوزان و *Linum album*

معمولًا از دو واحد فنیل پروپانوئیدی ساخته می‌شوند و در سازوکار دفاعی گیاهان برابر علفخواران و عوامل بیماری‌زا نقش دارند و فعالیت‌های زیستی گوناگونی از

**۱- مقدمه**  
لیگنان‌ها، گروه بزرگی از متabolیت‌های ثانوی است که در بسیاری از گیاهان ساخته می‌شود. این ترکیبات

اگرچه کاربرد ایسیتورها در کشت سلول گیاهان برای افزایش متابولیت‌های ثانوی چشم‌گیر بوده است، استفاده از این مواد برای افزایش تولید پودوفیلوتوکسین در کشت درون شیشه‌ای کمتر بررسی شده است نتایج پژوهش Muranaka و همکاران (1998)، نشان داد که استفاده از کیتواولیگوساکاریدها در کشت سلول *Juniperus chinensis* بسب افزایش ۱۵ برابری انباست پودوفیلوتوکسین می‌شود [5]. همچنین Esmaeilzadeh و همکاران (2011) نشان دادند که به دنبال افزودن ایسیتورهای قارچی، میزان پودوفیلوتوکسین در کشت تعلیقی کتان سفید افزایش می‌یابد [6]. در این پژوهش، اثر کیتوزان بر میزان پودوفیلوتوکسین در کشت تعلیقی گیاه *Linum album* بررسی شد. برای درک بهتر سازوکار اثر کیتوزان، بیان ژن‌های مسیر بیوستزی پودوفیلوتوکسین بررسی شد. از آنجا که آنزیم‌های CCR، CAD، PAL، تنظیم‌کننده آغاز مسیر و آنزیم PLR، تنظیم‌کننده پایان مسیر بیوستز پودوفیلوتوکسین وجود دارد. ایسیتورها ترکیباتی با منشا زیستی یا غیرزیستی است که با القای سامانه‌ی دفاعی باعث بیوستز و انباست متابولیت‌های ثانوی می‌شود [3]. کیتوزان (شکل د-استیله کیتین)، پلی‌ساکاریدی پلی‌کاتیونی است که از ترکیبات اصلی دیواره سلولی بسیاری از گونه‌های قارچی است و اثر آن به عنوان یک ایسیتور زیستی کارآمد برای بهبود بیوستز متابولیت‌های ثانوی در کشت سلولی بسیاری از گیاهان دارویی تأیید شده است [4].

## ۲- مواد و روش‌ها

### ۲-۱- جمع‌آوری و کشت بذرها

بذرهای *L. album* از منطقه سوهانک N<sup>19°</sup> E<sup>35°</sup> ۵۱° ۳۲' ۲۲' تهران جمع‌آوری شد. بذرها پس از شستشوی سطحی، ۱۰ دقیقه در محلول هیپوکلریت سدیم ۱ درصد قرار گرفتند، و سه بار با آب مقطر سترون، آبکشی شدند. سپس ۱۰ دقیقه در پراکسید هیدروژن ۳/۳ درصد قرار داده شدند و دوباره سه بار با آب سترون شستشو شدند. در مرحله‌ی پایانی یک دقیقه در الكل ۷۰

خود نشان می‌دهند [1]. پودوفیلوتوکسین از مهم‌ترین ترکیبات لیگنانی است که امروزه به عنوان ماده اولیه برای تولید برخی داروهای ضدسرطانی، اهمیت بسیاری پیدا کرده است. پودوفیلوتوکسین به خاطر سمیت سلولی بسیار بالایی که از خود نشان می‌دهد، به طور مستقیم استفاده نمی‌شود؛ و از آن برای ساخت سه داروی ضد سرطان teniposide و etoposide استفاده شود که در درمان سرطان‌های ریه، تخمدان و تومورهای مغزی کاربرد دارد [2]. اکنون پودوفیلوتوکسین را از گونه‌های مختلف *Podophyllum* که در معرض انقراض است، به دست می‌آورند. از آنزیم‌های مهم مسیر بیوستز پودوفیلوتوکسین می‌توان به فنیل‌آلانین آمونیالیاز (PAL)، سیناموئیل CoA ردوکتاز (CCR)، سیناموئیل الکل دهیدروژنаз (CAD) و پینورزینول - لاریسی رزینول ردوکتاز (PLR) اشاره کرد. گیاه کتان سفید (*Linum album*) از گونه‌های بومی ایران است که در اندام‌های مختلف، پودوفیلوتوکسین و دیگر ترکیبات لیگنانی دارد. با توجه به این که ساخت شیمیایی پودوفیلوتوکسین اقتصادی نیست، تولید آن با کشت سلول و اندام گونه‌های سرده *Linum* راه جایگزین سودمندی است. روش‌های زیادی برای افزایش تولید پودوفیلوتوکسین با کشت سلول وجود دارد. ایسیتورها ترکیباتی با منشا زیستی یا غیرزیستی است که با القای سامانه‌ی دفاعی باعث بیوستز و انباست متابولیت‌های ثانوی می‌شود [3]. کیتوزان (شکل د-استیله کیتین)، پلی‌ساکاریدی پلی‌کاتیونی است که از ترکیبات اصلی دیواره سلولی بسیاری از گونه‌های قارچی است و اثر آن به عنوان یک ایسیتور زیستی کارآمد برای بهبود بیوستز متابولیت‌های ثانوی در کشت سلولی بسیاری از گیاهان دارویی تأیید شده است [4].

سلول‌ها منحنی رشد رسم شد. برای تهیه محلول کیتوزان از روش خان و همکاران [7] استفاده شد؛ نخست، محلول استیک اسید یک درصد تهیه و سپس محلول کیتوزان در این اسید تهیه شد. پس از حل شدن کامل (2) ساعت در دمای 55 درجه سانتی‌گراد، pH محلول با NaOH به 5/7 رسید. سپس محلول کیتوزان و کیتین، 10 دقیقه در 120 درجه سانتی‌گراد اتوکلاو شد. برای اعمال تیمارها، 500 میلی‌گرم سلول (وزن تر) با استفاده از قیف بوخرن و در شرایط مکش برداشت شد و به بشقاب دارای پنج میلی‌لیتر از محیط کشت مایع، وارد شد. با توجه به منحنی رشد به دست‌آمده، در روز هفتم، سلول‌ها جداگانه با غلظت‌های 50، 100 و 200 میلی‌گرم در لیتر کیتوزان، تیمار شدند و با اندازه‌گیری میزان پودوفیلوتوکسین در آن‌ها، غلظت بهینه کیتوزان برای افزایش تولید این ماده به دست آمد. سپس سلول‌ها در زمان‌های 1، 2، 3 و 5 روز پس از تیمار با غلظت بهینه کیتوزان، برای بررسی اثر آن بر رشد سلولی، میزان پودوفیلوتوکسین و بیان ژن‌های مسیر بیوستتری آن، برداشت شدند.

#### 2-4- اندازه‌گیری رشد سلولی

رشد سلولی با اندازه‌گیری وزن خشک سلول‌ها تعیین شد. سلول‌ها با نایلون مش (42 $\mu\text{m}$ ) با استفاده از قیف بوخرن و در شرایط مکش، از محیط کشت جدا شده و برای تعیین وزن تر، بلافصله و برای اندازه‌گیری وزن خشک، پس از لیوفیلیزاسیون، وزن شدند.

#### 2-5- استخراج و سنجش لیگنان‌ها

به 50 میلی‌گرم وزن خشک سلول، یک میلی‌لیتر متانول 80 درصد اضافه، ساییده و همگن شد. مخلوط به دست

درصد قرار گرفتند و با آب مقطر سترون آبکشی شدند. بذرهای سترون، یک ساعت در محلول 0/5 گرم در لیتر زیرلین سترون شده، قرار گرفتند و سپس در محیط پایه MS کشت داده شدند. بذرها دو هفته در 25 درجه سانتی‌گراد و دوره 16 ساعت روشنایی و 8 ساعت تاریکی قرار گرفتند؛ از گیاهچه‌های حاصل برای ایجاد قطعات جداکشت و کشت بافت استفاده شد.

#### 2-2- القای تولید کالوس و راه‌اندازی کشت سلولی

برای القای کالوس، قطعاتی از گیاهچه به طول 1-2 سانتی‌متر برش داده شد و پس از آن، جداکشتهای ساقه-برگ به محیط کشت MS پایه دارای دو میلی‌گرم در لیتر نفتالن استیک اسید و 0/4 میلی‌گرم در لیتر کیتین در جابه‌جا شد. پس از دو هفته، القای کالوس آغاز شد. برای تهیه کشت تعلیقی، دو گرم کالوس نرم، سفید و همسن که پس از دو ماه، هشت بار واکشت شده بود به 50 میلی‌لیتر محیط کشت MS مایع با ترکیبات هورمونی گفته شده در بالا اضافه شد و روی لرزاننده با سرعت 120 دور در دقیقه در 25 درجه سانتی‌گراد در تاریکی نگهداری شده و هفته‌ای یک بار واکشت شد.

#### 2-3- تیمار سلول‌ها با کیتوزان


در این گام، نخست برای ایجاد یک کشت همگن، کشت سلولی تهیه شده مرحله پیش، شش بار واکشت شد. در هر مرحله، سلول‌ها با استفاده از قیف بوخرن و در شرایط مکش، جمع اوری و به محیط تازه جابه‌جا شدند. پیش از اعمال تیمارها، دوره رشد برای سلول‌ها تعیین شد؛ پس از جابه‌جایی یاخته‌ها به محیط جدید، از روز 1 تا روز 15 پس از جابه‌جایی، به فاصله زمانی دو روز، نمونه‌برداری انجام شد و بر اساس وزن خشک

بررسی کمی بیان ژن‌های مورد نظر، از ژن *GAPDH* به عنوان شاهد داخلی استفاده شد.

### 3- نتایج

#### 3-1- اثر غلظت‌های گوناگون کیتوزان بر میزان پودوفیلوتونکسین

بررسی لیگنان‌ها نشان داد که غلظت ۱۰۰ میلی‌گرم بر لیتر کیتوزان نسبت به سایر غلظت‌ها پودوفیلوتونکسین را به گونه‌ای معنی دار به میزان ۲ برابر (۳۶/۷) میکروگرم بر گرم وزن خشک) نمونه‌های شاهد افزایش داد (شکل ۱). در غلظت‌های ۵۰ و ۲۰۰ میلی‌گرم بر لیتر کیتوزان، تفاوت معنی‌داری در میزان پودوفیلوتونکسین دیده نشد.



شکل ۱ اثر غلظت‌های مختلف کیتوزان بر میزان پودوفیلوتونکسین در کشت تعلیقی کتان سفید. کیتوزان در روز هفتم از دوره رشد به محیط کشت اضافه شد و نمونه‌ها پس از ۵ روز برداشت شدند. مقادیر نشان داده شده، میانگین  $\pm$  SE تکرار و (انحراف معیار) است. میانگین‌های دارای حرف مشترک در هر تیمار، از نظر آماری در سطح ۵ درصد، تفاوت معنی‌دار ندارند.


آمده، ۱۵ دقیقه در حمام اولترا سونیک قرار گرفت و سانتریفوژ شد. محلول به دست آمده به لوله جدید جابه‌جا شد و فاز متابولی تبخیر شد. در ادامه به عصاره آبی باقی مانده، یک میلی لیتر آب و یک میلی لیتر اتیل استات افروده و سانتریفوژ شد. سپس فاز اتیل استات به لوله جدید جابه‌جا و تبخیر شد. سرانجام، رسوب خشک شده در یک میلی لیتر متابول حل و برای انجام HPLC با فیلتر ۰/۴۵ میکرون (Millipore, Bedford, MA, USA) HPLC (Shimadzu, Japan) فیلتر شد. سپس اجزای نمونه با دستگاه HPLC اندازه‌گیری شد. برای تأیید وجود پودوفیلوتونکسین در نمونه‌های بررسی شده از روش LC-MS استفاده شد. تعیین جرم مولکولی اجزای نمونه با روش Electrospray ionization mass spectrometry (ESI/MS) (Shimadzu, Japan) LC-20AD تعیین شد.

#### 6-2- بررسی بیان ژن‌ها

برای بررسی بیان ژن‌های مسیر بیوسنتزی پودوفیلوتونکسین از روش real time PCR با استفاده از SYBER Green استفاده شد. هر یک از نمونه‌های بررسی شده با استفاده از کیت QIAGEN Rneasy Plant mini kit شدن و برای حذف DNA ژنومی نیز از کیت DNase I استفاده شد. پس از تعیین غلظت RNA استخراج شده سنجش از جذب نوری در طول موج‌های ۲۶۰ و ۲۸۰ نانومتر رشتۀ mRNA مکمل از روی الگو با Superscript III reverse transcriptase استفاده از آنزیم ساخته شد.

آزمایش‌های qPCR روی نمونه‌ها در دستگاه ABI PRISM 7000 Sequence با استفاده از کیت SYBR

پودوفیلوتوکسین نسبت به نمونه‌های شاهد شد و این افزایش با گذشت زمان بیشتر شد، به گونه‌ای که پس از گذشت ۵ روز، به حدود دو برابر نمونه‌های شاهد رسید (شکل ۳).




شکل ۳ تغییرات میزان پودوفیلوتوکسین تحت اثر ۱۰۰ میلی‌گرم در لیتر کیتوzan در کشت تعیقی کتان سفید. کیتوzan در روز هفتم دوره رشد به محیط کشت اضافه شد. سلول‌ها، ۱، ۲، ۳ و ۵ روز پس از تیمار برداشت شدند. میانگین‌های دارای حرف مشترک از نظر آماری در سطح ۵ درصد تفاوت معنی‌دار ندارند.

**آنزیم‌های مسیر یوسنتزی پودوفیلوتوکسین**  
بررسی بیان ژن آنزیم‌های PAL، CAD، CCR و PLR نشان داد که بیان آن‌ها تحت اثر کیتوzan، افزایش یافت. بیشینه بیان آن‌ها در روز سوم دیده شد و در روز پنجم پس از تیمار، کاهش یافت (شکل ۴).

### ۳-۲-۳ اثر غلظت بهینه کیتوzan بر رشد سلولی با گذشت زمان


کیتوzan با غلظت ۱۰۰ میلی‌گرم در لیتر تا روز سوم اثر معنی‌داری بر رشد سلولی نسبت به نمونه‌های شاهد نداشت. پس از روز ۴، میزان رشد سلول‌ها کاهش یافت به گونه‌ای که بیشترین کاهش پس از پنج روز، به میزان ۳۰ درصد نسبت به نمونه‌های شاهد بود (شکل ۲).



شکل ۲ منحنی رشد سلولی تحت اثر ۱۰۰ میلی‌گرم بر لیتر کیتوzan در کشت تعیقی کتان سفید. کیتوzan در روز هفتم دوره رشد به محیط کشت اضافه شد. سلول‌ها، ۱، ۲، ۳ و ۵ روز پس از تیمار، برداشت شدند.

### ۳-۳-۳ اثر غلظت بهینه کیتوzan بر میزان پودوفیلوتوکسین

میزان پودوفیلوتوکسین در سلول‌های شاهد (تیمارنیافته) به آرامی افزایش یافت و در پایان دوره رشد، سرعت افزایش آن بیشتر شد. افزودن کیتوzan در روز هفتم، پس از گذشت یک روز، باعث افزایش معنی‌دار میزان



شکل ۴ اثر کیتوzan بر بیان ژن‌های *PAL*, *CAD*, *CCR* و *PLR*. نسبت تغییرات بیان ژن‌ها تحت اثر تیمار شاهد داخلی و مقایسه با بیان همان ژن در سلول‌های شاهد نشان داده شده است.

حسب گونه گیاهی فرق می‌کند. به عبارت دیگر غلطی از الیسیتور که در یک گیاه اثر تحریکی دارد، ممکن است بر گیاهی دیگر اثر نداشته باشد. غلظت ۲۰ میلی‌گرم بر لیتر کیتوzan باعث القای بیشترین میزان تولید آنتراکوئینون (Antraquinone) در کشت سلول *Rubia akane* شده است [11]. در حالی که غلظت ۲۰۰ میلی‌گرم بر لیتر کیتوzan، غلظت بهینه برای تولید متانول در کشت سلول *Mentha piperita* بوده است [12]. اثر الیسیتور کیتوzan بر میزان فنیل اتانوئید‌گلیکوزید در کشت سلول *Cistanche deserticola* نیز بررسی شده و بیشترین میزان فنیل اتانوئید‌گلیکوزید در غلظت ۱۰ میلی‌گرم در لیتر کیتوzan دیده شده است [4]. غلظت ۱ درصد (v/v) الیسیتورهای قارچی در کشت سلول کتان سفید، بیشترین

#### ۴- بحث

تا کنون بررسی‌های کمی در مورد اثر الیسیتورها بر میزان لیگنان‌ها در کشت تعیقی کتان سفید انجام شده است [8]. این بررسی، نخستین گزارش اثر کیتوzan بر مسیر بیوسنتز پودوفیلوتوکسین است. بررسی‌های زیادی نشان داده است که ترکیبات اصلی دیواره سلولی بسیاری از گونه‌های قارچی، مانند کیتین و کیتوzan، باعث افزایش متابولیت‌های ثانوی می‌شود [9]. در این پژوهش، اثر کیتوzan بر مسیر بیوسنتز لیگنان‌ها بررسی شد. برای به دست آوردن بیشترین میزان لیگنان‌ها بهینه‌سازی دقیق غلظت کیتوzan ضروری است. بررسی‌ها نشان داده است که غلظت الیسیتور نقش مهمی در فرایند تحریک دارد و بر شدت پاسخ مؤثر است [10]. غلظت مؤثر الیسیتور بر

بیشتر پودوفیلوتوکسین را القا کرد.

## 5- مراجع

- [1] Suzuki, and S. Umezawa, T. (2007): Biosynthesis of lignans and norilignans. *Journal of Wood Science*. 53, 273-284.
- [2] Farkya, S., Bisaria,V.S., and Sirvastava, A.K. (2004) Biotechnological aspects of the production of the anticancer drug podophyllotoxin. *Applied Microbiology Biotechnology*. 65, 504–519.
- [3] Zhao, J., Davis, L.C., and Verpoorte, R. (2005) Elicitor signal transduction leading to production of plant secondary metabolites. *Biotechnology Advances*. 23, 283–333.
- [4] Cheng, X., Zhou U., and Cui,X. (2006) Improvement of phenylethanoid glycosides biosynthesis in *Cistanche deserticola* cell suspension cultures by chitosan elicitor. *Biotechnology Journal*. 121, 253–260.
- [5] Muranaka, T., Miyata, M, Ito, K., and Tachibana, S. (1998) Production of podophyllotoxin in *Juniperus chinensis* callus cultures treated with oligosaccharides and a biogenetic precursor. *Phytochemistry*. 49, 491–496.
- [6] Esmaeilzadeh, S., Sharifi, M., Safaei, N., Murata, J., Yamagaki, T., and Satake, H. (2011) Increased lignan biosynthesis in the suspension cultures of *Linum album* by fungal extracts. *Plant Biotechnology Report* .5, 367-73.
- [7] Khan, W., Prithiviraj, and B. Smith D.L. (2003) Chitosan and chitinoligomers increase phenylalanine ammonia-lyase and tyrosine ammonia-lyase activities in soybean leaves.

اثر افزایشی را بر میزان لیگنان‌های پودوفیلوتوکسین و لاریسی رزینول نشان داده است [13]. در این پژوهش، بیشترین میزان پودوفیلوتوکسین در غلظت 100 میلی‌گرم بر لیتر کیتوزان دیده شد. نتایج این پژوهش نشان داد که کیتوزان، یک روز پس از افزوده شدن به محیط کشت، باعث افزایش میزان پودوفیلوتوکسین می‌شود و تا پایان دوره رشد، این روند ادامه دارد؛ به‌گونه‌ای که بیشترین میزان پودوفیلوتوکسین، پنج روز پس از اعمال تیمار به میزان دو برابر نمونه‌های شاهد، دیده شد. برای درک سازوکار کیتوزان و دلیل افزایش پودوفیلوتوکسین، بیان ژن‌های مسیر بیوسترزی لیگنان‌ها بررسی شد. افزایش بیان ژن *PAL* و دیگر ژن‌های مسیر فنیل پروپانوئیدی، از نخستین پاسخ‌های گیاهان در شرایط تنفس است [14]. بررسی بیان ژن‌های *CCR*, *CAD*, *PAL* تحت اثر الیستورهای قارچی در کشت سلول کتان زراعی (*Linum usitatissimum*) نشان می‌دهد بیان ژن این آنزیم‌ها به سرعت پس از 8 ساعت افزایش می‌یابد [15]. بررسی‌های Yousefzadi و همکاران (2010) نشان داد که افزایش تولید پودوفیلوتوکسین در سلول‌های کتان سفید تحت اثر سالیسیلیک اسید، در ارتباط با افزایش بیان ژن‌های *CCR*, *CAD*, *PAL* بوده ولی بیان ژن *PLR* تحت اثر این هورمون قرار نمی‌گیرد [16] در حالی که افزایش تولید لیگنان‌ها در کشت سلولی کتان سفید در حضور الیستورهای قارچی، تحت اثر افزایش بیان ژن‌های *PLR*, *CCR*, *CAD*, *PAL* صورت می‌گیرد [13]. نتایج این پژوهش نشان می‌دهد کیتوزان نیز با افزایش بیان ژن آنزیم‌های مسیر بیوسترزی لیگنان‌ها باعث افزایش میزان پودوفیلوتوکسین در کشت تعیقی کتان سفید می‌شود. با توجه به این نتایج، می‌توان با افزایش بیان ژن‌ها، تولید

- genes in cell cultures of *Linum album*. *Journal of Plant Physiology.* 169, 487– 491.
- [14] Wen, P.F., Chen, J.Y., Wan, S.B., Kong, W.F., Zhang, P., Wang, W., Zhan, J.C., Pan, Q.H., and Huang, W.D. (2008) Salicylic acid activates phenylalanine ammonia-lyase in grape berry in response to high temperature stress. *Journal of Plant Growth Regulator.* 55:1–10.
- [15] Hano, C., Addi, M., Bensaddek, L., Baltora-Rosset, S., Doussot, J., Maury, S., Mesnard, F., Chabbert, B., Hawkins, S., Laine, E., and Lamblin, F. (2006) Differential accumulation of monolignol-derived compounds in elicited flax (*Linum usitatissimum*) cell suspension cultures. *Planta:* 223: 975–989.
- [16] Yousefzadi, M., Sharifi, M., Behmanesh, M., Moyano, E., and Palazon, J. (2010) Salicylic acid improves podophyllotoxin production in cell cultures of *Linum album* by increasing the expression of genes related with its biosynthesis. *Biotechnology Letters.* 32, 1739–1743.
- Journal of Plant Physiology.* 160, 859–63.
- [8] Shams Ardakani, M., Hemati, S., and Mohagheghzadeh, A. (2005): Effect of elicitors on the enhancement of Podophyllotoxin biosynthesis in suspension culture of *Linum album*. *Daru.* 13, 56-60.
- [9] Pu, G.B., Dong-Ming, M., Chen, J.L., Ma, L.Q., Wang, H., and Li, G.F. (2009) Salicylic acid activates artemisinin biosynthesis in *Artemisia annua L.* *Plant Cell Report.* 28, 1127–1135.
- [10] Vasconsuelo, A., and Boland, R. (2007) Molecular aspects of the early stages of elicitation of secondary metabolites in plants. *Plant Science.* 172, 861-875.
- [11] Jin, H., J. Shin, Kim, J., and Chung, S. (1999) Effect of chitosan elicitation and media components on the production of anthraquinones colorants in Madder (*Rubia akane Nakai*) cell culture. *Biotechnology Bioprocess.* 4, 300–304.
- [12] Chang, J.H., Shin, I.S., and Chung, H.J. (1998) Improved menthol production from chitosan-elicited suspension culture of *Mentha piperita*. *Biotechnology Letter.* 20, 1097–1099.
- [13] Esmaeilzadeh, S., Sharifi, M., Behmanesh, M., Safaei, N., Murata, J., Araki, R., Yamagaki, T., and Satake H. (2012) Time-course changes in fungal elicitor-induced lignan synthesis and expression of the relevant